



Regelimpfplan

Stand Juli 2022

| Zeitpunkt | Impfung | |
|--|---|---|
| 8.-9 (10.) Lebenswoche | 1. 6fach- / oder 5fach-Impfung 1. Pneumokokken-Impfung 1. Rotavirus-Schluckimpfung | |
| | Frühgeborene < 37.SSW | Reifgeborene > 37.SSW |
| 3.-4. Monat | 2. 6fach- / 5fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung | ggf. 1. Meningitis B Impfung (Genehmigung der Kasse einholen!) |
| 4.-5. Monat (bei Vorsorgeuntersuchung U4) | 3. 6fach- / oder 5fach-Impfung 3. Pneumokokken-Impfung | 2. 6fach- / 5fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung |
| 6. Monat (bei der U5) | ggf. 1. Meningokokken B (Genehmigung der Kasse einholen!) 2. Impfung dann nach ca. 8 weiteren Wochen | ggf. 2. Meningitis B Impfung |
| 12. Monat (bei der U6) | 1. Masern/Mumps/Röteln/Windpocken- und Meningokokken-Impfung | |
| 13.-18. Monat | 4. 6fach- / oder 5fach-Impfung 4. Pneumokokken-Impfung | 3. 6fach- / 5fach-Impfung 3. Pneumokokken-Impfung |
| 15. bis 24. Monat (bis zur U7) | 2. Masern/Mumps/Röteln/Windpocken-Impfung und ggf. 3. Meningokokken B-Impfung | |
| mit ca. 6 Jahren | 1. Auffrischung Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten (unbedingt Windpocken-Impfung, falls das Kind diese bis dahin nicht gehabt hat.) | |
| mit 10-16 Jahren | 2. Auffrischung Polio/Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten Alle Mädchen und Jungen!!! gegen Humanes Papilloma-Virus (HPV, d.h. Gebärmutterhalskrebs bzw. Genitalwarzen (Jungs) nur 2x, wenn vor dem 15. Geburtstag begonnen wird, sonst muss 3x geimpft werden) | |
| Und weiter ... | Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten alle 10 Jahre oder in der Spätschwangerschaft oder auch werdende Väter/Großeltern schon früher! Auch wenn die Letzte Impfung noch keine 10 Jahre zurückliegt! | |

Unabhängig von diesem Regelimpfplan können Sie ihr Kind **jährlich** (am besten im Herbst) gegen **Grippe** impfen lassen. Dies ist insbesondere für Kinder mit chronischen Lungenerkrankungen, überempfindlichen Bronchien oder auch mit Herzfehler oder Diabetes empfohlen. Über die sich ändernden Corona Impfempfehlungen lesen Sie bitte die Updates auf unserer Homepage.

Pneumokokkenimpfung: Für Risikogruppen (s. Impfinformation der Praxis) ist eine zusätzliche Impfung empfohlen und sie sollten sich dann alle 6 Jahre auffrischen lassen.

FSME-Impfung bei Reisen in Gebiete, in denen diese durch Zecken übertragene Erkrankung vorkommt.

Hepatitis A für Reisen in südliche Länder

Ggf. Typhus/Tollwut