



## Regelimpfplan (Stand Juli 2020)

Zeitpunkt	Impfung
8.-9. (10.) Lebenswoche	1. 6fach- / oder 5fach-Impfung 1. Pneumokokken-Impfung 1. Rotavirus-Schluckimpfung
3.-4. Monat (falls gewünscht)	ggf. Meningokokken B-Impfung (Genehmigung der Kasse einholen!)
4. Monat (bei der Vorsorgeuntersuchung U4)	2. 6fach- / 5fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung
5.-6. Monat (Regelimpfung bei Frühgeborenen < 37 SSW)	Für Frühgeborene < 37 Schwangerschaftswochen: 3. 6fach- / oder 5fach-Impfung 2. oder 3. Pneumokokken-Impfung 3. Rotavirus-Schluckimpfung
5.-6. Monat (falls gewünscht)	ggf. 2. Meningokokken B-Impfung
6.-7. Monate (bei der Vorsorgeuntersuchung U5)	ggf. 3. Rotavirusimpfung, wenn nicht schon erfolgt; bei Frühgeborenen < 37 SSW: 2. Meningitis B Impfung, falls gewünscht
12. Monat (bei der Vorsorgeuntersuchung U6)	1. Masern/Mumps/Röteln-Impfung (kombiniert mit Windpocken-Impfung; falls nicht später gewünscht) und Meningokokken
13.-18. Monat	4. 6fach- / oder 5fach-Impfung + Pneumokokken
15. bis 24. Monat (bis zur U7)	2. Masern/Mumps/Röteln/Windpocken-Impfung Und ggf. 3. Meningokokken B-Impfung
mit ca. 6 Jahren	1. Auffrischung Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten (ggf. Hepatitis B-Impfung jetzt Nachholen bei vorangegangener 5fach-Impfung; unbedingt Windpocken-Impfung, falls das Kind diese bis dahin nicht gehabt hat.)
mit 10-16 Jahren	2. Auffrischung Polio/Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten (Hepatitis B-Impfung spätestens jetzt!)  Alle Mädchen und Jungen! gegen HPV – Humanes Papilloma-Virus (Gebärmutterhalskrebs bzw. Genitalwarzen (Jungs) nur 2x, wenn vor dem 15. Geburtstag begonnen wird, sonst muss 3x geimpft werden)
Und weiter ... alle 10 Jahre	Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten
Unabhängig von diesem Regelimpfplan können Sie ihr Kind jährlich (am besten im Herbst) gegen Grippe impfen lassen. Dies ist insbesondere für Kinder mit chronischen Lungenerkrankungen, überempfindlichen Bronchien oder auch mit Herzfehler oder Diabetes empfohlen.	
Pneumokokkenimpfung: Für Risikogruppen (s. Impfinformation der Praxis) ist eine zusätzliche Impfung empfohlen und sie sollten sich dann alle 6 Jahre auffrischen lassen.	
FSME-Impfung bei Reisen in Gebiete, in denen diese durch Zecken übertragene Erkrankung vorkommt.	
Hepatitis A für Reisen in südliche Länder, Ggf. Typhus/Tollwut	