



Dr. **Timnik** & Dr. **Reiter**
Kinder- und Jugendarztpraxis

DOSIERANLEITUNG
Paracetamol

Sprechzeiten Mo bis Fr 8-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-18 Uhr | Fr 14-17 Uhr

Paracetamol wirkt schmerzlindernd und fiebersenkend.

Dosierung

Paracetamol wird nach dem Körpergewicht (ab mehr als 3 kg) dosiert. Der Abstand der Einzelgaben sollte mindestens 6 Stunden betragen, die 24-Stunden Tagesdosis darf 60 mg pro kg Körpergewicht (also z.B. 600 mg bei 10 kg Körpergewicht) nicht überschreiten. Die Wirkung tritt schnell ein und hält 4-6 Stunden an. **Einzeldosis: 10-15 mg x kg Körpergewicht.**

Paracetamol ist bei kurzzeitiger Anwendung gut verträglich, kann aber bei überhöhter Dosis eine dauerhafte, schwere, auch tödliche Leberschädigung und ein akutes Nierenversagen hervorrufen.

Achtung: Kinder mit schwerer Erkrankung der Leber dürfen kein Paracetamol erhalten!
Für Kinder mit eingeschränkter Nierenleistung passen wir die Dosis an.