



Dr. **Timnik** & Dr. **Reiter**  
Kinder- und Jugendarztpraxis

DOSIERANLEITUNG  
**Ibuprofen**

**Sprechzeiten** Mo bis Fr 8-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-18 Uhr | Fr 14-17 Uhr

**Ibuprofen** wirkt schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmend.

## Dosierung

Ibuprofen wird nach dem Körpergewicht (ab mehr als 6 kg) dosiert. Der Abstand der Einzelgaben sollte 8 (mind. 6) Stunden betragen. Die Einzeldosis beträgt ca. 10 mg x kg Körpergewicht, d.h.:

Einzeldosis des 2%igen Saftes (1 ml = 20 mg): **0,5 ml x kg Körpergewicht**

Einzeldosis des 4%igen Saftes (1 ml = 40 mg): **0,25 ml x kg Körpergewicht**

Die 24-Stunden Tagesdosis darf das 4-fache der Einzelhöchstdosis nicht überschreiten, also höchstens 40 mg x kg Körpergewicht. Die Wirkung tritt innerhalb von 15 Minuten ein und kann bis zu 8 Stunden anhalten. Ibuprofen ist bei kurzzeitiger Anwendung gut verträglich.

**Achtung:** Bei Kindern mit erheblichem Wasserverlust besteht die Gefahr des Nierenversagens! Bei Varizellen-Infektionen (Windpocken, Gürtelrose) sollte Ibuprofen wegen der Gefahr schwerer Haut- und Schleimhaut-Komplikationen nur nach Rücksprache gegeben werden.