



Regelimpfplan

Stand Juni 2026

Zeitpunkt	Impfung		
	Reifgeborene > 37.SSW		Frühgeborene < 37.SSW
8.-9. Lebenswoche	1. 6fach-Impfung / 1. Pneumokokken-Impfung / 1. Rotavirus-Schluckimpfung		
9.-10. Lebenswoche (1-2 Wochen nach 1. Impfung)	1. Meningokokken B-Impfung	RSV Prophylaxe (Okt. - März)	1. Meningokokken B-Impfung
11.-12. Lebenswoche (4 Wochen nach 1. Impfung)			2. 6fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung
4.-5. Monat (bei Vorsorgeuntersuchung U4)	2. 6fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung		3. 6fach-Impfung 3. Pneumokokken-Impfung 3. Rotavirus-Schluckimpfung
6. Monat (bei der U5)	2. Meningokokken B-Impfung		2. Meningokokken B-Impfung
12. Monat (bei der U6)	1. Masern/Mumps/Röteln und Windpocken-Impfung		
	3. 6fach-Impfung		4. 6fach-Impfung
13.-14. Monat	3. Meningokokken B-Impfung		
	3. Pneumokokken-Impfung		4. Pneumokokken-Impfung
17.-18. Monat (bis zur U7, 24. M.)	2. Masern/Mumps/Röteln/Windpocken-Impfung		
mit ca. 6 Jahren	1. Auffrischung Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten (Unbedingt Windpocken-Impfung, falls das Kind diese bis dahin nicht gehabt hat.)		
mit 10-16 Jahren	2. Auffrischung Polio/Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten Impfung gegen Meningokokken Typen ACWY (ab 12 Jahren!) Alle Mädchen und Jungen!!! gegen Humanes Papilloma-Virus (HPV, d.h. Gebärmutterhalskrebs bzw. Genitalwarzen (Jungs) nur 2x, wenn vor dem 15. Geburtstag begonnen wird, sonst muss 3x geimpft werden)		
Und weiter ...	Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten alle 10 Jahre oder in der Spätschwangerschaft oder auch werdende Väter/Großeltern schon früher! Auch wenn die Letzte Impfung noch keine 10 Jahre zurückliegt!		

Unabhängig vom Regelimpfplan können Sie ihr Kind **jährlich** (am besten im Herbst) gegen **Grippe** impfen lassen. Dies ist insbesondere für Kinder mit chronischen Lungenerkrankungen, überempfindlichen Bronchien oder mit Herzfehler oder Diabetes empfohlen.
Über die sich ändernden Corona-Impfempfehlungen lesen Sie bitte die Updates auf unserer Homepage.

Pneumokokken-Impfung: Für Risikogruppen (s. Impfinformation der Praxis) ist eine zusätzliche Impfung empfohlen und sie sollten sich dann alle 6 Jahre auffrischen lassen.

FSME: Zunächst 3 Impfungen: 1. Impfung zu einem beliebigen Zeitpunkt (z. B. bei U7), 2. Impfung nach 4 Wochen, 3. Impfung nach weiteren 6-12 Monaten; danach Auffrischungen alle 5 Jahre

Hepatitis A: für Reisen in südliche Länder

Ggf. Typhus/Tollwut