



## Regelimpfplan

Stand Februar 2026

Zeitpunkt	Impfung				
	Reifgeborene > 37.SSW	Frühgeborene < 37.SSW			
8.-9. Lebenswoche	1. 6fach-Impfung / 1. Pneumokokken-Impfung / 1. Rotavirus-Schluckimpfung				
9.-10. Lebenswoche (1-2 Wochen nach 1. Impfung)	1. Meningokokken B-Impfung	RSV Prophylaxe (Okt. - März)	1. Meningokokken B-Impfung		
11.-12. Lebenswoche (4 Wochen nach 1. Impfung)			2. 6fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung		
4.-5. Monat (bei Vorsorgeuntersuchung U4)	2. 6fach-Impfung 2. Pneumokokken-Impfung 2. Rotavirus-Schluckimpfung		3. 6fach-Impfung 3. Pneumokokken-Impfung 3. Rotavirus-Schluckimpfung		
6. Monat (bei der U5)	2. Meningokokken B-Impfung		2. Meningokokken B-Impfung		
12. Monat (bei der U6)	1. Masern/Mumps/Röteln und Windpocken-Impfung				
	3. 6fach-Impfung	4. 6fach-Impfung			
13.-14. Monat	3. Meningokokken B-Impfung				
	3. Pneumokokken-Impfung	4. Pneumokokken-Impfung			
17.-18. Monat (bis zur U7, 24. M.)	2. Masern/Mumps/Röteln/Windpocken-Impfung				
mit ca. 6 Jahren	1. Auffrischung Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten (Unbedingt Windpocken-Impfung, falls das Kind diese bis dahin nicht gehabt hat.)				
mit 10-16 Jahren	2. Auffrischung Polio/Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten Impfung gegen Meningokokken Typen ACWY (ab 12 Jahren!) Alle Mädchen <b>und Jungen!!!</b> gegen Humanes Papilloma-Virus (HPV, d.h. Gebärmutterhalskrebs bzw. Genitalwarzen (Jungs) nur 2x, wenn vor dem 15. Geburtstag begonnen wird, sonst muss 3x geimpft werden)				
Und weiter ...	Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten alle 10 Jahre oder in der Spätschwangerschaft oder auch werdende Väter/Großeltern schon früher! Auch wenn die Letzte Impfung noch keine 10 Jahre zurückliegt!				

Unabhängig von diesem Regelimpfplan können Sie ihr Kind **jährlich** (am besten im Herbst) gegen **Grippe** impfen lassen. Dies ist insbesondere für Kinder mit chronischen Lungenerkrankungen, überempfindlichen Bronchien oder auch mit Herzfehler oder Diabetes empfohlen. Über die sich ändernden Corona Impfempfehlungen lesen Sie bitte die Updates auf unserer Homepage.

**Pneumokokken-Impfung:** Für Risikogruppen (s. Impfinformation der Praxis) ist eine zusätzliche Impfung empfohlen und sie sollten sich dann alle 6 Jahre auffrischen lassen.

**FSME-Impfung:** alle Kinder ab ca 3 bis Jahren und auch die Erwachsenen; Ausnahme: wenn Sie im Stadtgebiet Augsburg leben, das nach wie vor nicht zu den Risikogebieten gehört.

**Hepatitis A** für Reisen in südliche Länder

Ggf. Typhus/Tollwut